Štandardné dispenzačné postupy: flukonazol (systémovo)

PharmDr. Peter Stanko
Univerzitná lekáreň, FaF UK, Bratislava

Štandardné dispenzačné postupy sú všeobecné postupy a odporúčania na dispenzačnú činnosť poskytovanú pacientovi v rámci lekárenskej starostlivosti ako neoddeliteľná súčasť zdravotnej starostlivosti o pacienta. Štandardné dispenzačné postupy sa týkajú liekov registrovaných na Slovensku a zohľadňujú všetky odborné aspekty vyplývajúce z platných súhrnov liekových charakteristík (SPC) schválených Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv a/alebo Európskou liekovou agentúrou. Štandardné dispenzačné postupy v predkladanej podobe nie sú legislatívne záväzné.

Kľúčové slová: dispenzácia, dispenzačné minimum, konzultačné minimum, štandardné dispenzačné postupy.

Dispensing guidelines: naproxen, systemic and local administration

Dispensing guidelines represent general methods and recommendations for pharmacy dispensation provided as a standard patient care in the scope of pharmaceutical care. Dispensing guidelines are presented for all drugs registrated in Slovak republic. They include all professional aspects and skills according to specific product characteristics (SPC) approved by Slovak Institute of Drug Controle and/or European Medicines Agency. Dispensing guidelines in present template and content are not directed by law.

Key words: dispensing, dispensing basics, consultation basics, dispensing guidelines.

Prakt. lekárn., 2015; 5(1): 19

Úvod

Systémové antimykotiká na jednorazové podanie sú liečivá používané na profylaxiu, terapiu systémových, genitálnych a slizničných kandidóz, kryptokokóz, dermatomykóz, systémových endemických mykóz. Sú určené iba na krátkodobé nárazové použitie. Opakované alebo dlhšie podávanie je nutné konzultovať s lekárom. Uvedené štandardné dispenzačné postupy sa týkajú predovšetkým perorálnych prípravkov s obsahom flukonazolu určených na jednorazové podanie a dostupných bez lekárskeho predpisu. Flukonazol je súčasťou perorálnych liekov zo skupiny systémových antimykotík.

Indikácie

- terapia systémových, genitálnych a slizničných kandidóz, kryptokokóz, dermatomykóz, systémových endemických mykóz

Dispenzačné minimum

Perorálne formy: Liek sa podáva jednorazovo každý deň alebo v stanovených odstupoch v jednotlivej dávke 50 – 200 mg (výnimočne sa na začatie liečby môže použiť dávka 400 mg). U detí nad 3 roky sa podáva 3 mg/deň v jednej dávke (prvá dávka môže byť jednorazovo zvýšená na 6 mg/deň). Liek sa užíva nezávisle od jedla (pri problémoch s GIT sa prednostne užíva tesne po jedle) a zapije sa dostatočným množstvom tekutiny. Liečba by mala pokračovať až do úplného vymiznutia príznakov ochorenia.

Kontraindikácie a iné obmedzenia na použitie

- vek do 3 rokov, respektíve telesná hmotnosť do 20 kg
- súčasná terapia astemizolom a terfenadínom
- alergia na flukonazol
- u pacientov s hepatálnymi dysfunkciami by mal terapiu flukonazolom zvážiť odborný lekár
- v prípade výskytu bulóznych lézií alebo erythema multiforme je potrebné zvážiť ďalšie pokračovanie terapie flukonazolom
- podávanie flukonazolu dojčiacim matkám nie je vhodné

Konzultačné minimum

Bolo použitie systémových antimykotík konzultované s vaším lekárom?

Ak nebolo, je potrebné poučiť pacienta o vhodnosti informovania svojho lekára o použití flukonazolu.

Používa pacient v súčasnosti iné formy antimykotickej liečby?

V prípade, ak užívateľka používa aj iné formy antimykotík, je vhodné konzultovať užitie flukonazolu s lekárom.

Trpí pacient akútnym alebo chronickým ochorením pečene?

V prípade ťažkej hepatálnej nedostatočnosti je použitie flukonazolu potrebné konzultovať s lekárom.

Je pacientom dojčiaca žena?

V období dojčenia nie je vhodné používať prípravky s obsahom flukonazolu.

Mal pacient v minulosti zaznamenanú alergickú reakciu na flukonazol alebo príbuzné látky?

V prípade zaznamenanej alergie na flukonazol alebo príbuzné látky je potrebné zvážiť užitie. V prípade zaznamenanej alergie na niektoré iné látky je potrebné preveriť, či tieto nie sú súčasťou lieku.

Má pacient predpisované iné lieky na pravidelné užívanie?

V prípade pravidelného užívania liekov predpisovaných lekárom je potrebné overiť interakčný potenciál príslušných liečiv. V prípade zaznamenania potenciálnej liekovej interakcie je potrebné poučiť pacienta o postupe vedúcom k maximálnej eliminácii rizika prejavu liekovej interakcie.

Zvykne pacient užívať lieky dostupné bez lekárskeho predpisu?

V prípade príležitostného užívania liekov dostupných bez lekárskeho predpisu je potrebné overiť interakčný potenciál príslušných liečiv. V prípade zaznamenania potenciálnej liekovej interakcie je potrebné poučiť pacienta o postupe vedúcom k maximálnej eliminácii rizika prejavu liekovej interakcie.

Zdroj: ADC ČÍSELNÍK, www.adcc.sk

PharmDr. Peter Stanko
Univerzitná lekáreň, FaF UK v Bratislave
Ružinovská 12, 821 01 Bratislava
peter.stanko@pharminfo.sk

